



Václavík Jiří
Dolany 22, 533 45 okr. Pardubice
Tel.: 777003062-4
email: info@jedlehouby.cz

ŠUPINOVKA NAMEKO

Houba připomíná naší penízovku sametonohou. Obě houby jsou si podobné i způsobem pěstování. Liší se však rozšířením - zatímco penízovka sametonohá je druh kosmopolitní, Šupinovka nameko byla zatím nalezena pouze v Japonsku, na Tchajwanu a v Číně. Její název pochází z japonštiny, kde "nameko" znamená slizký. Klobouk dosahuje podle podmínek, ve kterých houba vyrostla, velikosti 2-15 cm. Povrch plodnic je hladký, lesklý, uprostřed hnědý, na okraji světlejší. V mládí s oranžovým slizem, který hustě pokrývá mladá primordia, na dospělých plodnicích slizu ubývá. Lamely mladých plodnic jsou světle žluté a s postupující zralostí hnědnou. Třeň s prstenem, je dlouhý 3-7 cm (někdy však i několikanásobně delší) a je pokrytý vlákny.

V kuchyni: Šupinovka nameko patří v Asii mezi významné pěstované druhy. Je obecně známa a pěstována v Jihovýchodní Asii. Je oblíbena a ceněna pro jemnou chuť a poněkud slizkou konzistenci, která se během vaření ztrácí.

Jak postupovat při pěstování?

Odstříhnete plastový obal tak, aby Vám zbyla asi 5cm vysoká vanička v které ponechte substrát a umístěte jej místo, kde je zaručeno: dostatek světla přírodního či umělého po dobu asi 8 hod denně, ale ne přímé sluneční záření s teplotou v rozmezí 8°C až 20°C. V této teplotě substrát zůstává po celou dobu pěstování.

Pro pěstování v místnostech, kde není zaručena dostatečná vlhkost vzduchu, doporučujeme blok umístit například do prázdného akvária nebo do libovolné přepravky či bedýnky, kterou překryjeme plastovou folií. Můžeme pro něj též vyrobit takzvaný minifoliovník, tj konstrukci ze dřeva či kovu potaženou igelitem. Blok můžeme také příležitostně mlžit vodou z rozprašovače. Houby se musí stále udržovat vlhké – slizké.

Asi za týden po umístění bloku do vhodného prostředí dojde k uzrání hub. Správná doba sklizně je dána okamžikem, kdy se klobouk rozvine a na jeho spodní straně jsou vidět lamely, ale klobouk přitom stále zůstává lehce podvinutý. Plodnice je nutné odřezávat či stříhat těsně u bloku, protože zbytky třeně by se po několika dnech začaly rozkládat a plesnivět. Po skončení sklizňové vlny je nutné blok očistit od všech odumřelých částí. Substrát plodí ve více vlnách.

Mnoho úspěchů při pěstování Vám přeji

jedlehouby.cz